



 **betaline**  
Siempre que lo necesites





La gama de betalactámicos  
de **Laboratorios Syva**

# Índice

Amoxoil retard.....	4
Benzatard.....	5
Exabiopen.....	6
Dexabiopen.....	7
Procactive.....	8
Actionis.....	9
Mamifort.....	10
Mamifort secado.....	11
Cefamax.....	12
Syvamox.....	13



# Amoxoil retard

## COMPOSICIÓN

- Amoxicilina (trihidrato): 150 mg/ml.

## ESPECIES DE DESTINO



## INDICACIONES

Tratamiento de infecciones causadas por bacterias sensibles a la amoxicilina localizadas en:

- Tracto digestivo.
- Tracto respiratorio.
- Tracto urogenital.
- Piel y tejidos blandos.
- Así como complicaciones bacterianas sensibles a la amoxicilina.

## PRESENTACIONES

- 100 y 250 ml.

4



**Primera  
elección<sup>1</sup>**



**Amplitud  
de indicaciones**

**Óptima  
suspensión**

**Larga  
acción<sup>2</sup>**



<sup>1</sup> Grupo D según categorización de antibióticos del Plan Nacional Resistencia de Antibióticos.

<sup>2</sup> Dosis única. En caso necesario, repetir la administración a las 48 horas.

# Benzatard

## COMPOSICIÓN

- Bencilpenicilina procaína monohidrato: 150,00 mg/ml.
- Bencilpenicilina benzatina tetrahidrato: 125,00 mg/ml.

## ESPECIES DE DESTINO



## INDICACIONES

- Tratamiento de infecciones agudas causadas por microorganismos sensibles a la combinación de bencilpenicilina procaína y bencilpenicilina benzatina.

## PRESENTACIONES

- 100 ml.



5



**Primera  
elección<sup>1</sup>**



<sup>1</sup> Grupo D según categorización de antibióticos del Plan Nacional Resistencia de Antibióticos.

<sup>2</sup> Dosis única.



# Exabiopen



## COMPOSICIÓN

- Bencilpenicilina (procaína): 200.000 UI/ml.
- Dihidroestreptomicina (sulfato): 250 mg/ml.

## ESPECIES DE DESTINO



## INDICACIONES

Tratamiento de infecciones bacterianas, postoperatorias y/o secundarias a infecciones víricas, causadas por gérmenes sensibles a la asociación, tales como:

### Bovino/ovino:

- Abscesos cutáneos.
- Actinomycosis.
- Afecciones podales.
- Artritis.
- Carbunco bacteridiano.
- Leptospirosis.
- Mamitis.
- Metritis.
- Neumonía y bronconeumonía.

### Porcino:

- Artritis.
- Aborto (por Brucellas, Leptospiras y otros gérmenes sensibles).
- Leptospirosis.
- Mal rojo.
- Neumonía y bronconeumonía.
- Síndrome MMA.

## PRESENTACIONES

- 100 y 250 ml.



**Amplitud  
de indicaciones**

**Óptima concentración  
250 mg/ml de  
dihidroestreptomicina**

# Dexabiopen

## COMPOSICIÓN

- Bencilpenicilina procaína: 200 mg/ml.
- Dihidroestreptomicina: 200 mg/ml (equivalente a 250 mg de sulfato de dihidroestreptomicina).
- Dexametasona: 0,5 mg/ml (equivalente a 0,68 mg de fosfato sódico de dexametasona).

## ESPECIES DE DESTINO



## INDICACIONES

Tratamiento de las siguientes infecciones causadas por cepas bacterianas sensibles a la bencilpenicilina y a la dihidroestreptomicina y que cursan con inflamación aguda:

### Bovino:

- Infecciones respiratorias causadas por *Pasteurella multocida*.

### Porcino:

- Infecciones respiratorias causadas por *Actinobacillus pleuropneumoniae* y/o *Pasteurella multocida*.
- Meningitis causada por *Streptococcus suis*, *Listeria monocytogenes* y/o *Haemophilus parasuis*.
- Enfermedad de Glässer causada por *Haemophilus parasuis*.

## PRESENTACIONES

- 50, 100 y 250 ml.



Composición



Tratamiento  
de infecciones  
que cursan con  
inflamación aguda






# Procactive

## COMPOSICIÓN

- Benzilpenicilina procaína monohidrato: 300 mg/ml (equivalente a 170,40 mg de benzilpenicilina).

## ESPECIES DE DESTINO



## INDICACIONES

Para el tratamiento de infecciones sistémicas en bovino, ovino y porcino (con peso superior a 25 kg) causadas por o asociadas a bacterias sensibles a benzilpenicilina.

## PRESENTACIONES

- 100 y 250 ml.



**Primera elección<sup>1</sup>**



**Tiempos de espera muy cortos**

**Amplitud de indicaciones**



<sup>1</sup> Grupo D según categorización de antibióticos del Plan Nacional Resistencia de Antibióticos.



# Actionis

## COMPOSICIÓN

- Ceftiofur (como ceftiofur hidrocloreuro) 50 mg/ml.

## ESPECIES DE DESTINO



## INDICACIONES

### Bovino:

- Metritis aguda post-parto.
- Panadizo interdigital y pododermatitis.
- Infecciones respiratorias.

### Porcino:

- Infecciones respiratorias (*Pasteurella multocida*, *Actinobacillus pleuropneumoniae* y *Streptococcus suis*).

## PRESENTACIONES

- 100 y 250 ml.



9



**Tiempo de espera corto**  
6 días en carne y 0 horas en leche.

Óptima  
jeringabilidad



# Mamifort



## COMPOSICIÓN (por jeringa de 8 g)

- Ampicilina (sódica): 75 mg/jeringa.
- Cloxacilina (sódica): 200 mg/jeringa.

## ESPECIES DE DESTINO



En lactación


## INDICACIONES

Tratamiento de mastitis clínicas, en vacas en lactación, causadas por *Arcanobacterium pyogenes*, *Staphylococcus aureus*, *Streptococcus spp* y *Escherichia coli* sensibles a la asociación ampicilina-cloxacilina.

## PRESENTACIONES

- 1 blíster de 4 jeringas.
- Cubo con 48 jeringas.

10



<sup>1</sup> Grupo D según categorización de antibióticos del Plan Nacional Resistencia de Antibióticos.

# Mamifort secado

## COMPOSICIÓN (por jeringa de 8 g)

- Ampicilina (trihidrato): 250 mg/jeringa.
- Cloxacilina (benzatina): 500 mg/jeringa.

## ESPECIES DE DESTINO



En secado

## INDICACIONES

Para el tratamiento y prevención de mastitis en vacas durante el periodo de secado, causadas por *Staphylococcus aureus*, *Streptococcus* spp., *Arcanobacterium pyogenes* y *Escherichia coli* sensibles a la asociación ampicilina/cloxacilina.

## PRESENTACIONES

- 1 blíster de 4 jeringas.
- Cubo con 48 jeringas.



**Primera  
elección<sup>1</sup>**



**Composición**

**Amplio  
espectro  
de acción**



<sup>1</sup> Grupo D según categorización de antibióticos del Plan Nacional Resistencia de Antibióticos.



# Cefamax



## COMPOSICIÓN (por jeringa de 10 ml)

- Cefapirina (benzatina): 300 mg/jeringa.

## ESPECIES DE DESTINO



En secado

## INDICACIONES

**Vacas en secado:** Tratamiento de mamitis subclínicas y prevención de nuevas infecciones, producidas por *Staphylococcus aureus*, *Streptococcus agalactiae*, *Streptococcus dysgalactiae* y *Streptococcus uberis*.

## PRESENTACIONES

- Caja con 20 jeringas + 20 toallitas limpiadoras.

12



Tiempo de  
espera corto



Secados de  
corta duración

Fácil  
aplicación

Amplio espectro  
de acción



# Syvamox

## COMPOSICIÓN

- Amoxicilina (trihidrato): 700 mg/g.

## ESPECIES DE DESTINO



Cebo

## INDICACIONES

Tratamiento de infecciones del tracto respiratorio causadas por cepas de *Pasteurella multocida* sensibles a la amoxicilina.

## PRESENTACIONES

- 1.000 g.



13



Tratamiento oral







Siempre que lo necesites

